

Dosaggio dei farmaci per via intranasale.

Farmaco	Indicazioni	Dose pediatrica	Dose adulti	Note
Midazolam	Crisi convulsive	Peso in kg x 0.2 mg = dose totale (max 10 mg)	Peso > 50mg = 10 mg (2ml)	La dose totale va divisa per le due narici
Fentanil	Trattamento del dolore acuto	1,5 - 3 mcg/kg	1,5 - 3 mcg/kg	La dose totale va divisa per le due narici
Sufentanil	Trattamento del dolore acuto	0,2 – 1,5 mcg/kg	0,2 – 1,5 mcg/kg	La dose totale va divisa per le due narici
Ketamina	Sedazione e trattamento del dolore acuto	6 – 9 mg/kg	6 – 9 mg/kg	Per procedure chirurgico/ortopediche o sedute TAC/RMN
Naloxone	Overdose da oppiacei		2mg	Usare la forma concentrata 1mg/ml
Flumazenil	Overdose da benzod.	0.01mg/kg ev. ripetibili	0,2 mg ev. ripetibili	
Glucagone	Ipoglicemia documentata		2mg	La dose totale va divisa per le due narici

NOTE:

- prima di utilizzare un farmaco per via IN, verificare che le narici siano libere da muco o sangue che riducono la capacità di assorbimento della mucosa
- somministrare sempre metà dose del farmaco per narice
- non utilizzare più di 1 ml di farmaco per narice; se sono necessari volumi maggiori, attendere alcuni minuti per permettere l'assorbimento della prima dose.
- in caso di effetti clinici inadeguati, attendere 10-15 minuti e quindi somministrare una seconda dose.
- tener presente che l'utilizzo di dispositivi tipo il MAD determinano uno "spazio morto" di circa 0,2 ml.